

CANNA HYDRO SCHEMA DI COLTIVAZIONE ACQUA DURA



GUIDA ALLA
COLTIVAZIONE
ONLINE

	FASE VEGETATIVA				FASE GENERATIVA						
	RADICAZIONE		I		I		II	III	IV		
ORE DI LUCE	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Dosaggio in ml per 10 L											
CANNA HYDRO VEGA A (HW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
CANNA HYDRO VEGA B (HW)	24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
CANNA HYDRO FLORES A (HW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
CANNA HYDRO FLORES B (HW)					28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
CANNA RHIZOTONIC	40	20	20	20	5	5	5	5	5		
CANNAZYM		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
CANNABOOST			20	20	20 - 40 **	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
CANNA PK 13/14								15			
CANNA FLUSH									40		40
mS/cm											
EC ACQUA	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
EC SOLUZIONE	1,5 - 1,9	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	2,0 - 2,4	1,4 - 1,9	1,2 - 1,7	
EC TOTALE	2,1 - 2,5	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,6 - 3,0	2,0 - 2,5	1,8 - 2,3	0,6

Radicazione:

Radicazione e accrescimento del volume della pianta

Fase vegetativa I:

Stagnazione della crescita o primi segni di sviluppo floreale.

Fase generativa I:

Sviluppo in lunghezza dei fiori o dei frutti.

Fase generativa II:

Ingrandimento dei fiori o dei frutti.

Fase generativa III:

Accrescimento dei fiori o dei frutti (peso).

Fase generativa IV:

Fine della maturazione.

Questo programma di coltivazione è pensato per piante che sviluppano fiori o frutti, a partire da una talea o piantina di una settimana. La durata di ciascuna fase può variare a seconda della specie.

* Raddoppiare il dosaggio di CANNAZYM a 50 ml/10 L, se il substrato viene riutilizzato.

** Aumentare CANNABOOST fino a un massimo di 40 ml/10 L durante la fioritura per una forza extra.

Per una fase di crescita più lunga, ripetere i dosaggi raccomandati del periodo di radicazione II (GG 6-25).

Per una fase di fioritura più lunga, ripetere i dosaggi raccomandati della fase generativa I (S3-S5).

Aggiungere CANNA PK 13/14 nel periodo 3-4 settimane prima del raccolto.

