



	FASE VEGETATIVA				FASE GENERATIVA							
	RADICAZIONE	I	II		I	II	III	IV				
<b>ORE DI LUCE</b>	18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
<b>Dosaggio in ml per 10 L</b>												
<b>CANNA COCO A</b>	26 - 33	26 - 33	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	26 - 33	26 - 33		
<b>CANNA COCO B</b>	26 - 33	26 - 33	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	29 - 37	26 - 33	26 - 33		
<b>CANNA RHIZOTONIC</b>	40	20	20	20	5	5	5	5	5			
<b>CANNAZYM</b>		25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50	
<b>CANNA BOOST</b>			20 **	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	
<b>CANNA PK 13/14</b>								15				
<b>CANNA CALMAG AGENT ***</b>	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	0 - 7	
<b>CANNA FLUSH</b>									40		40	
<b>mS/cm</b>												
<b>EC ACQUA ***</b>	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
<b>EC SOLUZIONE</b>	1,4 - 1,8	1,4 - 1,8	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	1,6 - 2,0	2,0 - 2,5	1,4 - 1,8	1,4 - 1,8		
<b>EC TOTALE</b>	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	2,0 - 2,4	2,0 - 2,4	2,0 - 2,4	2,0 - 2,4	2,0 - 2,4	2,4 - 2,9	1,8 - 2,2	1,8 - 2,2	0,4	

Questo programma di coltivazione è pensato per piante che sviluppano fiori o frutti, a partire da una talea o piantina di una settimana. La durata di ciascuna fase può variare a seconda della specie.

- \* Raddoppiare il dosaggio di CANNAZYM a 50 ml/10 L, se il substrato viene riutilizzato.
- \*\* Aumentare CANNABOOST fino a un massimo di 40 ml/10 L durante la fioritura per una forza extra.
- \*\*\* La dose di CANNA CALMAG AGENT dipende dalla conducibilità elettrica (EC) dell'acqua, che idealmente dovrebbe essere compresa tra 0,2 e 0,4 mS/cm. Se l'acqua di partenza ha un'EC di 0,0, è possibile applicare Calmag alla dose massima per raggiungere un'EC di 0,4 mS/cm. Se invece l'acqua di partenza ha già un'EC superiore a 0,0, si dovrebbe utilizzare una dose inferiore di Calmag. Questo esempio di programma presume un'acqua con EC (corretta con Calmag) pari a 0,4 mS/cm.

Per una fase di crescita più lunga, ripetere i dosaggi raccomandati della fase vegetativa I (GG 6-25).

Per una fase di fioritura più lunga, ripetere i dosaggi raccomandati della fase generativa I (S3-S5).

Aggiungere CANNA PK 13/14 nel periodo 3-4 settimane prima del raccolto.

