

CANNA HYDRO ACQUA DURA

SCHEMA DI COLTIVAZIONE



GUIDA ALLA
COLTIVAZIONE
ONLINE

ORE DI LUCE

FASE VEGETATIVA				FASE GENERATIVA						
RADICA- ZIONE	I	II		I			II	III	IV	
18	18	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Dosaggio in ml per 10 L										
24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
24 - 31	28 - 35	28 - 35	28 - 35							
				28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
				28 - 35	28 - 35	28 - 35	28 - 35	24 - 32	21 - 28	
40	20	20	20	5	5	5	5	5		
	25	25	25	25	25	25	25	25	25 - 50 *	25 - 50
		20 **	20	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40	20 - 40
							15			
								40		40
mS/cm										
0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
1,5 - 1,9	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	1,7 - 2,1	2,0 - 2,4	1,4 - 1,9	1,2 - 1,7	
2,1 - 2,5	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,3 - 2,7	2,6 - 3,0	2,0 - 2,5	1,8 - 2,3	0,6

Radicazione:
Inizio / radicazione;
Inumidire il substrato.

Fase vegetativa I:
Accrescimento del
volume della pianta.

Fase vegetativa II:
Stagnazione della
crescita o primi segni
di sviluppo floreale.

Fase generativa I:
Sviluppo in lunghezza
dei fiori o dei frutti.

Fase generativa II:
Ingrandimento dei fiori
o dei frutti.

Fase generativa III:
Accrescimento dei fiori
o dei frutti (peso).

Fase generativa IV:
Fine della maturazione.

Questo programma di coltivazione è pensato per piante che sviluppano fiori o frutti, a partire da una talea o piantina di una settimana. La durata di ciascuna fase può variare a seconda della specie.

* Raddoppiare il dosaggio di CANNAZYM a 50 ml/10 L, se il substrato viene riutilizzato.

** Aumentare CANNABOOST fino a un massimo di 40 ml/10 L durante la fioritura per una forza extra.

Per una fase di crescita più lunga, ripetere i dosaggi raccomandati della fase vegetativa I (GG 6-25).

Per una fase di fioritura più lunga, ripetere i dosaggi raccomandati della fase generativa I (S3-S5).

Aggiungere CANNA PK 13/14 nel periodo 3-4 settimane prima del raccolto.

